



RECOMMANDATIONS SUITE A LA MISE EN PLACE D'UN PLÂTRE/BANDAGE

Définition d'un plâtre/bandage :

Le plâtre ou bandage sert à immobiliser un membre ou une articulation. Suite à la mise en place d'un plâtre ou d'un bandage, il est très important de bien respecter les recommandations afin d'assurer la réussite de la procédure. Le non-respect de ces recommandations pourrait entraîner des complications telles que les infections, les ulcères de pression et parfois même la nécrose de la patte.

1. GARDER PROPRE ET SEC

Vous devez mettre un sac en plastique par-dessus le bandage lors des sorties à l'extérieur afin d'éviter qu'il ne soit mouillé ou sali. Par contre, il ne faut pas laisser le sac en tout temps sur le bandage.

2. REPOS COMPLET

Votre animal doit être au repos complet lorsqu'il a un bandage/plâtre. Le repos est une étape très importante à la bonne guérison d'une fracture avec un bandage/plâtre. La durée peut varier d'une condition à l'autre (âge, type de fracture). Il faut donc éviter les escaliers, les courses, les jeux et les longues promenades. Ainsi, il y a moins de risques que le bandage glisse et se déplace.

3. VÉRIFIER CHAQUE JOUR

- **Les doigts ou les orteils** : ils ne doivent pas être enflés.
- **L'odeur** : il ne doit pas y avoir d'odeur nauséabonde.
- **La position du bandage/plâtre** : vérifier qu'il n'a pas glissé ou qu'il ne soit pas rendu trop petit si vous avez un animal en croissance.
- **Le confort** : il est anormal que soudainement votre animal éprouve une douleur au membre affecté et cherche à mordre ou arrache son bandage.
- **Le collier élisabéthain** : doit être porté en tout temps afin qu'il ne mordille pas son bandage.

4. RÉÉVALUATIONS

Il est fort probable que durant la période de convalescence, votre vétérinaire veuille revoir l'animal afin de changer le bandage et/ou suivre l'évolution du traitement. Par contre, s'il y a un problème (bandage mouillé, odeur nauséabonde, déplacement du bandage, douleur soudaine, etc.) entre les examens vétérinaires, vous devez prendre rendez-vous aussitôt. Après plusieurs semaines, des radiographies de contrôle seront effectuées afin de vérifier que la fracture est bien guérie. Selon les observations du vétérinaire, le bandage pourra être retiré ou un autre bandage peut être remis en place pour quelques jours supplémentaires. Advenant le retrait du bandage, l'activité pourra être reprise graduellement.